

客户名称 山东新华				产品名称 复方氨林巴比妥注射液2ml10支小盒				制作 初永美		校对 王文霞	
成品尺寸 152×80×15mm				对此制版是否有改动意见 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无				材质 300G灰底白板		电子监管码 条码长度(mm) 条码高度(mm)	
客户签字				请对此稿内容进行确认: 文字\尺寸\版式\颜色\条码\电子监管码				日期 2020.11.16			
制版号 20C-11-112				山东鲁信天一印务有限公司							



1701539 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

20C-11-112 2020.11.16 CYM/Y0309U006

国药准字H37023824

复方氨林巴比妥注射液

Fufang Anlinbabituo Zhusheyeye

2ml: 氨基比林0.1g, 安替比林40mg, 巴比妥18mg·10支



山东新华制药股份有限公司

SHANDONG XINHUA PHARMACEUTICAL CO.,LTD.

生产日期:
产品批号:
有效期至:


301030081E

复方氨林巴比妥注射液

码上放心·追溯码

用手机淘宝扫码查询

电话查询: 010-95001111



81544950544686901665

复方氨林巴比妥注射液说明书

核准日期: 2007.05.28
修改日期: 2011.05.31
修改日期: 2020.12.01

请仔细阅读说明书并在医师指导下使用
严禁用于食品和饲料加工

【药品名称】
通用名称: 复方氨林巴比妥注射液
英文名称: Compound Aminophenazone and Barbitol Injection
汉语拼音: Fufang Anlinbabituo Zhusheyeye

【成份】
本品为复方制剂,其组分为:每2ml(支)含氨基比林0.1g,安替比林40mg,巴比妥18mg。
辅料:依地酸二钠。

【性状】 本品为无色或微黄色的澄明液体。

【适应症】
主要用于急性高热时的紧急退热,对发热时的头痛症状也有缓解作用。

【规格】 复方制剂。

【用法用量】 肌内注射。
成人一次2ml(1支),或遵医嘱。在监护情况下最大量为一日6ml(3支)。
小儿2岁以下一次0.5~1ml($\frac{1}{4}$ ~ $\frac{1}{2}$ 支),2~5岁一次1~2ml($\frac{1}{2}$ ~1支),大于5岁一次2ml(1支)。
本品不宜连续使用。

【不良反应】
1. 过敏性休克,表现为胸闷、头晕、恶心呕吐、血压下降、大汗淋漓等症状,应立即停药并抢救。
2. 粒细胞缺乏,紫癜,有时急性起病。
3. 皮疹、荨麻疹、表皮松懈症等。

【禁忌】
对哌啶酮类或巴比妥类药物过敏者,及用本品有过敏史者严禁使用。

【注意事项】
1. 肌内注射前应向病人询问是否有哌啶酮类或巴比妥类药物过敏史,有过敏史者应避免使用本品,过敏性体质者亦应慎用。
2. 不得与其他药物混合注射。
3. 长期使用可引起粒细胞减少,再生障碍性贫血及肝肾损害等严重中毒反应。
4. 呼吸系统有严重疾病及呼吸困难者慎用本品。
5. 体弱者慎用。
6. 本品仅对症治疗,在解除高热症状后对因治疗,在应用本品无明显效果时应改用其他方法治疗,避免盲目大量应用本品。
【孕妇及哺乳期妇女用药】

尚不明确。
【儿童用药】 未进行该项实验且无可参考文献。
【老年用药】 老年患者的肾功能可能有一定程度的生理性减退,应采用较小治疗量。
【药物相互作用】
巴比妥有抑制呼吸中枢作用,对能抑制呼吸的药物有加强作用,如硫酸庆大霉素等,应禁止同时应用。
【药物过量】
未进行该项实验且无可参考文献。
【药理毒理】
本品为解热镇痛药。氨基比林和安替比林同属于哌啶酮类解热镇痛药,能抑制下视丘前列腺素的合成和释放,恢复体温调节中枢感受神经元的正常反应性而起退热作用,同时还通过抑制前列腺素等的合成而起镇痛作用。氨基比林并能抑制炎症局部组织中前列腺素的合成和释放,稳定溶酶体膜,影响吞噬细胞的吞噬作用而起抗炎作用。合用巴比妥,可加强镇痛作用。
【药代动力学】
氨基比林 $t_{1/2}$ 为1~4小时,大部分在肝内去甲基成为4-氨基安替比林,再经乙酰化变成N-乙酰氨基安替比林,自尿中排出。
安替比林 $t_{1/2}$ 约12小时,肝中代谢,与葡萄糖醛酸结合在尿中排出,约5%为原形从尿中排出。
【贮藏】 遮光,密闭保存。
【包装】 2ml安瓶,10支/盒。
【有效期】 24个月。
【执行标准】 国家药监局标准WS-10001-(HD-1327)-2003。
【批准文号】 国药准字H37023824
【生产企业】
企业名称: 山东新华制药股份有限公司
生产地址: 山东省淄博市高新区鲁泰大道1号
邮政编码: 255086
电话号码: 0533-2196361
传真号码: 0533-2196365
网 址: www.xhzy.com
【药品上市许可持有人】
企业名称: 山东新华制药股份有限公司
注册地址: 淄博市高新技术产业开发区化工区
邮政编码: 255000
电话号码: 0533-2166666
传真号码: 0533-2184991
网 址: www.xhzy.com

2ml: 氨基比林0.1g, 安替比林40mg, 巴比妥18mg·10支

【贮藏】遮光,密闭保存。
【适应症】:【用法用量】:【不良反应】:【禁忌】:【注意事项】等详见说明书。
【性状】本品为无色或微黄色的澄明液体。
辅料为依地酸二钠。
本品为复方制剂,其组分为:每2ml(支)含氨基比林0.1g,安替比林40mg,巴比妥18mg。